

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

聖濟總錄纂要卷二

詳校官太醫院恩釋_臣袁夫錫

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修_臣倉聖脈

校對官中書_臣陸湘

謄錄監生_臣朱和臣

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要卷二

休寧程林纂

諸風門

蠱風

論曰蠱風之狀在皮膚間一身盡痛若刺若刺淫淫躍躍如中蠱毒故名蠱風皆由體虛受風侵傷正氣也

天麻丸方 治蠱風如皮膚刺割

天麻 躑躅花 獨活 附子 白附子 原蠶

蛾炒 防風 蒼耳 蒺藜子 烏頭去皮臍各一兩 麻黃

去根 烏蛇肉 麝香

除研者外搗羅為末入麝香再研勻鍊蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下不拘時候如有汗出即宜避風

石南湯方 治六十四種風注走皮膚中如蠱行痛如刺刺狀似蠱毒及卒風面目腫起手不及頭口噤不能

言

石南

乾薑

黃芩

細辛

人參

各一兩

桂

麻

黃

去根節

當歸

芍藥

各一兩

乾地黄

三分

目草

炙二兩

食

茱萸

一兩一分

呔咀如麻大每服六錢水酒同煎溫服得汗為度

何首烏散方

治蠱風

何首烏

威靈仙

各一兩

苦參

半兩

麒麟竭

一分

並生搗為散入乳鉢內研三五百遍每服一錢用荊

芥湯調下每日三服酒服尤妙

薄荷丸方 治蠱風皮膚苦盡痛若刀割狀及頭目不
利風痰等疾

薄荷葉

一兩

天麻

四兩

威靈仙

三兩

羌活

四兩

山梔子仁

二兩

蔓荊實

三兩

白芷

桔梗

防風

各一兩

大黃

濕紙裹煨令紙

乾一兩

人參

赤茯苓

各三兩

龍腦

研半兩

搗研為末再和勻鍊蜜丸如鷄頭實大每服一九食
後細嚼茶酒任下

肌肉攣動

論曰肌肉攣動命曰微風蓋邪搏分肉衛氣不通陽氣
內鼓故肌肉攣動然風之入脉善行數變亦為口眼攣
動偏喎之病也

虎骨丸方 治風虛肌肉攣動手足顫掉

虎脰骨

酥炙

松節

剉酒炒

天麻

牛膝

酒浸

赤箭

海桐

皮獨活

石斛

去根

防風

烏蛇

酒浸去皮骨

酸棗仁

當歸

仙靈脾

甜瓜子

洗焙

乳香

研

五加皮

各一

兩

一十六味先以十五味搗羅為細末入研者乳香再和勻酒煮麴糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸荊芥酒或茶酒任下不拘時候

天麻丸方 治循經絡肌肉瞶動頭目昏眩手足麻痺

天麻

芎藭

各一兩

荊芥穗

雞蘘藥

各三兩

白附子

甘草

各半兩

右六味為末鍊蜜丸如櫻桃大每服一九茶酒任下

荊芥湯方 治風氣肌肉瞤動頭目昏眩四肢煩疼

荊芥穗

旋復花

各四兩

前胡

甘草

炙

麻黃

去根節

芍藥

芎藭

半夏

洗七遍各一兩

每服三錢葱白三寸雞蘓二葉同煎溫服

風癰

論曰風癰之狀發無常時每發則仆地吐涎沫無所覺知蓋由血氣皆虛精神離散魂魄失守風邪入于陰經故也又以胞胎之初其母卒大驚精氣併居能令子發

癩其證與風癩大率相似

丹砂煎方 治風癩疾時發時省涉厯年月

丹砂

細研水飛濾過後
焙研如粉三兩

石膏

五兩
研細

黃連

去鬚
篩一斛生

地黃

研取自然
汗二升

共四味以清水一斗先煮石膏黃連取五升淨去滓
次下生地黃汁又煎之如稠錫始下火取丹砂粉投
入勺攪百餘徧貯於不津器中更攪待冷即住手每
日兩度以溫水調服約如半彈丸大服藥後只吃淡

飯蔓菁菜等

雄黃丸方 治五癲各有聲牛癲若牛鳴馬癲若馬鳴
狗癲若狗鳴羊癲若羊鳴鷄癲若鷄鳴凡此五癲皆宜服
之

雄黃丹砂

雄黃

三味各二兩碎同用生絹袋
貯之入十兩壺內重湯煮待

壺赤色滴如珠引若線為度取藥囊出河水洗滌
淘漉出曝乾入乳鉢中研如粉為度其壺即丸藥

用

黑鉛

二兩大火化用錢匙掩掠去塵垢者用精
者一兩將無油淨器中下水銀及鉛同銷

鎔攪令勻瀉于熱鐵器內待冷先將前水銀一
三味石藥乳鉢內研次入鉛同研取勻水銀兩

共五味各如前修製畢便將前煮丹砂雄黃雌黃餘
蜜再重湯煮散少少點入藥中漸漸和勻為丸如大
麻粒每用桃柳栢桑木嫩條各長七寸寸剉以水一
升煎至六合去滓分溫下丸藥空心午時臨臥下三
九至五九小兒一九至二九

羚羊角丸方 治風癩瘡

羚羊角 犀角 遠志 人參 山藥 茯苓

各一

兩 防風 一兩 生地黃 三分 金箔 研 銀箔 研 各一 麥冬 半

鐵粉

研

天冬

各三兩

龍齒

研三兩

水銀

一分入金銀箔龍齒鐵粉

五件同研水銀無星子為度

共十五味先將十味搗羅為末入別研者用拌令勻
鍊蜜和丸如菉豆大用桃柳枝湯下二十九日二夜
一或人參茯苓湯亦可

風癰

論曰風癰病者由心氣不足胸中蓄熱而又風邪乘之
病間作也其候多驚目童子大手足顫掉夢中呌呌身

熱瘧搖頭口噤多吐涎沫無所覺知是也然病發於陽者易差發於陰者難治故經曰臟病難治腑病易治又曰大人曰癰小兒曰癰

靈烏散方 治風癰多驚手足顫掉口吐涎沫

烏鴟

一隻臘月取于瓷瓶內盛以鹽泥固濟令乾用炭火煨存性候冷取出去肚腸研

丹

砂

研一分

細辛

二兩

乾蠍

全者十枚炒

共四味將二味研末與別研二味同羅每服半錢匕

午前溫酒調下

安息香丸方 治男婦暗風癰病

安息香

通明無砂石者 鉛丹

二味為細末入白羊心中血研勻丸如梧桐子大每服十九空心溫水下

神聖丸方 治風癰涎潮等疾

雌黃

鉛丹 各一兩

細研以醋一斛熬稠丸如桐子大與惡實末同收每服十九臨臥煎惡實末湯下

丹砂九方 治風邪諸癇狂言妄走精神恍惚思慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地口吐白沫口噤戴眼魂魄不守年歲深遠者

丹砂

光明者
研一兩

酸棗仁

微炒
研

乳香

光瑩者
各半兩
研

合研令勻先令病人盡量飲酒沉醉次取藥五錢匕

酒一盞調下於靜室中安睡勿令驚動候其自覺則愈

鐵粉烏鴉散方 治風癇

烏鴉

一隻去腸
肚及嘴足

鉛丹

黑鉛

鐵粉

研各
二兩

丹砂

一兩

研先將鐵粉并鉛丹入鐵器內熟炒次入黑鉛一處結成砂子入在烏鴉腹內縫合以躡子或用物蓋定鹽泥固濟放乾用熟火一秤煨令同赤取出搗為末次入丹砂更研如粉入後七味天麻

羌活 獨活 防風 芎藭 乾蠍 天南星

各二兩

共研為細末入麝香少許再研令勻每服半錢匕臨臥冷酒調下

五生丸方 治癰疾

乾薑下炮 烏頭生去皮臍 半夏生用 附子生去皮臍 大豆末

生用

共五味除大豆末外細剉為末以豆末煮糊為丸如桐子大每服三九冷酒下

半夏丸方 治風癰痰盛癰瘰口吐涎沫

半夏

湯浸去滑生為末五兩

白礬

生為末二兩

丹砂

研

鉛丹

研各一兩

同研勻以粟飯為丸如梧桐子大每服食後生薑湯

下二十九

五枝煎方 治風癰多驚手足顫掉身熱癰瘰

桃枝 柳枝 桑枝 夜合枝 槐枝

並剉如豆
大各一斗

大豆

一升
淘過

共六味用水一石慢慢火煎候豆爛及嚼諸枝無味
即濾汁於銀石器內煎令得所不可熬過以瓷器盛
每服一匙頭許入盧會末少許溫酒化破空心徐徐
服

治風癰癰瘕不省方

虎糞

曝乾

野豬骨并蹄

炙各不
拘多少

共研為散每日空心以酒調下二錢忌一切有足之物

水銀九方 治風癰

水銀

半兩

雄黃

研

龍腦

研

牛黃

研各一分

丹砂

研一錢

再同研勻用糯米飲和丸如菉豆大每服五丸至七丸熟水下空心臨臥日再服

風狂

論曰風狂之狀始發則少卧不飢自高自賢自辨自貴

蓋人之榮衛周身循環晝夜不窮一失其平則有血并於陰而氣并於陽者有血并於陽而氣并於陰者陰陽二氣虛實不調風邪乘虛而入并於陽則謂之重陽故其病妄笑好樂妄行不休甚則棄衣而走登高而歌或至數日不食故曰狂也又肝藏魂魂則隨神往來悲哀動中有陽於魂則為狂妄是亦血氣俱虛風邪乘之陰陽相并也

真珠散方 治風狂妄語心熱狂走不知人

真珠

研

牛黃

研

丹砂

研各半兩

金箔

研

銀箔

研各十片

五麝

香

研一錢

鐵粉

研

天竺黃

人參

龍腦

研各三分

黃芩

一兩防風

犀角

鎔各半兩

茯神

三錢

麥門冬

一兩半

遠志

白鮮皮

羚羊角

鎔各半兩

甘草

炙

胡黃連

白菊花

白附子

各三分

除研外搗羅為末入研藥拌勻每服一錢加至二錢

薄荷溫水或梨汁調下

茯神湯方

治風狂失神少臥不飢笑樂無節棄衣登

高

茯神

去木

杏仁

湯去皮尖雙仁各三兩

龍齒

六兩

凝水石

一片

升麻

二兩

石膏

碎二兩

沙參

白茯苓

白鮮皮

各二兩

生麥

門冬

四兩

劉如麻豆每服五錢水煎溫服如病甚煎成入竹瀝
半合再煎服

腦風

論曰內經謂風氣循風府而上則為腦寒夫風生高遠

始自陽經然督脉陽維之會自風府而上至腦戶腦戶者督脉足太陽之會也又太陽之脉起於目内眦上額交巔上入絡腦今風邪客搏其經稽而不行則腦髓内弱故項背怯寒而腦戶多風冷也

石膏散方 治腦風邪氣留連頭痛不已

石膏

火煨研

天南星

炮

白殭蠶

炒

三味等分搗研為散每服二錢匕葱白二寸臘茶一錢同連鬚葱煎湯頓服良久再服

穀精草散方 治腦風頭痛吹鼻

穀精草 末 銅綠 研各一錢 硝石 半錢 研

共研和勻每用一匙吹入鼻內或偏頭疼隨病左右吹鼻中

通關散方 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕

多嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶蛾 瓦上炒 白附子 炮 苦參 益智 皮 蒺藜子

炒去 乾薄荷 各一兩

共為散每服一錢匕溫調下日三服

點頭散方 治腦風頭痛吹鼻

細辛

高良薑

瓜蒂

各一分

硝石

半兩

共研為細散用新水滿含一口搗藥半匙入鼻中良久即定

遠志散方 治腦風頭痛不可忍

遠志

去心不拘多少

為細散每用半匙先含水滿口即搗藥入鼻中仍搽

痛處

羌活丸方

治腦風氣鼓或膈痰氣逆上冲於頭令頭

旋運

羌活

去蘆頭米泔浸一宿切焙乾二兩半

白蒺藜

炒去角

芎藭

乾鷄

蘇

各二兩

白殭蠶

去頭角炒一兩

共為細末鍊蜜為丸如彈子大荆芥茶嚼下一粒不拘時候入龍腦麝香尤妙

何首烏丸方

治腦風鼻息不通清涕流出及諸風疾

何首烏

去黑皮
三兩

芍藥

一兩
桂皮
去粗

烏頭

芍藥

甘

草

炙

藁本

甘松

羌活

天麻

陳橘皮

湯浸
去白

縮沙蜜

去皮各
二兩

墨

煨存性
一分

右一十三味共為末鍊蜜和丸如櫻桃大每服一丸

薄荷蔥酒嚼下不計時候

芎藭湯方

治腦風鼻息不通或流清涕多嚏

芎藭

二兩

細辛

去苗
葉

黃芩

去黑心
各一兩

荊芥穗

二兩

甘草

炙

半兩

每服三錢水一盞入薄荷七葉同煎至七分去滓溫服

吹鼻散方 治腦壅頭痛

盧會

研

龍腦

研

瓜蒂

搗

硝石

研

四味等分為末每用一豆許吹之

勝金散方 治腦風頭痛鼻塞不通或流清涕多嚏不

已

荊芥穗

薄荷葉

各四兩

木賊

去節二兩

蛇蛻

二條炙

四味搗羅為散每服二錢清茶調下食後日三服

風頭眩

論曰風頭眩之狀頭與目俱運是也五臟六腑之精華皆見於目上注於頭風邪鼓於上腦轉而目系急便真氣不能上達故虛則眩而心悶甚則眩而倒仆也

枳實湯方 治風頭運倒眼旋腦項急痛

枳實

去瓤
麩炒

防風

麻黃

去根節先煎
掠去沫焙乾

芎藭

各一兩

杏

仁

去皮尖雙
仁炒一兩

半夏

為末生薑汁
和作餅曝乾

細辛

各二兩

麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至一盞去滓入
竹瀝半合更煎沸早晚食前溫服

人參湯方 治頭風眩但覺地屋俱轉目閉不開

人參 防風 白朮 當歸酒灑切焙 麥門冬去心焙

獨活去蘆頭 黃芪 桂皮去粗 芍藥各一兩半

麤擣篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫
服日再夜一

獨活湯方 治風頭眩仆地屋轉嘔吐痰涎惡聞人聲

獨活

去蘆頭

茯神

去木各半兩

甘草

炙

當歸

酒洗焙切 牡蠣

煅

白朮

附子

肉蓯蓉

酒浸切焙各一兩

黃芪

兩半

防風

遠志

去心三分 人參

二兩半

剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑三片棗一枚
去核煎至一盞去滓溫服不拘時

菊花湯方

治風頭眩悶起即欲倒頭痛眼疼視屋轉

動

甘菊花

細辛

去苗葉各半兩

防風

前胡

茯神

白

朮

麻黃

去根節
各一兩

芎藭

杏仁

湯浸去皮尖
雙仁各三分

每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入竹瀝半合更

煎沸食前溫服

山藥散方

治風頭目眩眼痛耳聾

山藥

甘草

五味子

甘菊花

擇各半兩

細辛

山

茱萸

升麻

蔓荊實

各三分

防風

一兩

為細散每服三錢匕空心溫酒下

附子膏方

治風頭眩摩頭

附子

去皮
臍

鹽花

各半
兩

為細末以麻油和如稀錫洗頭摩之日三

守中丸方

治風頭眩腦轉目系急忽然倒仆

白茯苓

去黑皮
十兩

麥門冬

去心
三兩

白朮

人參

甘菊

花

擇去
梗

山藥

枸杞子

各二
兩

生地黄

二十斤
取汁

共八味將七味搗羅為末先用生地汁於銀器內入

酥三兩白蜜三兩同煎逐旋掠取汁上金花令盡得

五升許於銀器內拌炒前七味藥漸漸令盡候乾入

白蜜同搗數十杵丸如梧桐子大每日空心或食後
清酒下五十丸服百日後五臟充滿肌膚潤滑修合
須擇四季旺相日或甲子日此藥亦名五芝地僊金
髓丸

風頭痛

論曰風頭痛之病由風邪客於陽經循風府而上至於
頭腦令人頭重疼痛心膈煩熱上焦壅滯頭面虛汗診
其脉左手寸口浮緊者是也

石膏散方 治風壅頭痛眉骨疼

石膏研 芫薺 旋復花各一兩 白附子炮 細辛去葉

甘草炙各一兩

共搗羅為散每服半錢匕臘茶調下不拘時候

清氣香芫湯方 治頭痛

芫薺五兩 細辛去苗葉二兩半 人參一兩半 半夏麴一分用生薑和半夏

末作麴用 甘草炙三分

右五味㕮咀如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑三

片薄荷五葉同煎七分溫服不拘時候

芎藭散方 治風頭痛

芎藭 莎草根炒去毛 藿香葉 荊芥穗各一兩 石

膏碎一兩半

共為散每服三錢匕荊芥湯調下食後服

丹砂丸方 治諸風頭痛不可忍者

丹砂別研 石膏燒通赤地 白附子炮為末 龍腦少許

研

共同研令勻粟米飯丸如菉豆大更以丹砂為衣每服五丸食後薄荷茶嚙下

六神散方 治頭痛眼睛痛

鷄蘇

芎藭

馬牙硝

研各二錢

石膏

研

乳香

研各一兩

龍

腦

研一匙

共研為細末每用一匙含水搐於鼻中

吹鼻麝香散方 治頭痛不可忍

藜蘆

和州者一莖

一味暴乾研為散入麝香麻子許研勻吹鼻中

通頂散方 治鼻塞及頭痛

馬牙硝

研細半兩 地黄汁一合

二味相和於銅器內用慢火煎乾取出研細每挑少許入鼻搐上吐痰即差

偏頭痛

論曰偏頭痛之狀由風邪客於陽經其經偏虛者邪氣湊於一邊痛連額角故謂之偏頭痛也

至靈散方

治偏頭痛

雄黃

研

細辛

去苗葉為末等分

二味再同研每用一匙左邊痛搐入右邊鼻右邊痛

亦然

乳香散方

治偏頭痛不可忍

乳香

如皂子大

高良薑

如指頭大

二味於火上燒迎烟熏鼻隨痛左右用之

天南星散方

治偏頭痛

天南星

酸漿水煮透心
硬切暴乾一兩

菊花

三分

自然銅

燒赤醋
淬一兩

防

風

半兩用水一挑同菊花自然銅防風三味煮
水盡為度去防風自然銅不用只單用菊花

薊

一兩

五味除二味不用外搗羅為細散每服半錢匕臘茶

清少許調只作一口呷盡分作三嚥每嚥點頭一點

單撥散方

治偏頭痛

單撥

一味為細末每用一匙先令病人含滿口溫水隨病

左右搐入鼻中

漏風

論曰內經曰飲酒中風則為漏風漏風之狀或多汗不可單衣食則汗出甚則身寒喘息惡風衣裳濡口乾善渴不能勞事又曰身熱解情汗出如浴惡風少氣亦名漏風夫酒以養陽酒入於胃與穀氣相薄熱盛於中其氣慄悍與陽氣俱泄使人腠理虛而中風故其證多汗惡風不可單衣其喘息而少氣者熱薰於肺風客於皮

毛也其口乾善渴者汗出多而亡津液也其解情而不能勞事者精氣耗不能營其四肢也謂之漏風以汗出不止若器之漏久而不治轉為消渴

澤瀉散方 治漏風身熱解情汗出如浴惡風少氣

澤瀉 白朮

各二兩半 麋銜一兩

為散每服二錢沸湯調食後服

黃耆湯方 治風虛多汗夜臥尤甚牀席衣被並溼

黃耆 人參 各二兩 麻黃根 牡蠣 煨赤各三兩 地骨皮

二兩
半 龍骨 四兩

每服三錢棗二枚同煎空心服日二

防風散方 治風虛多汗惡風

防風 一兩
一分 澤瀉 牡蠣 煨赤桂 各三

為細散每服二錢溫酒調下空心服日再

杜仲散方 治風虛多汗夜臥尤甚

杜仲 炙炒 二兩 黃芪 牡蠣 煨赤各 二兩 麻黃根 五兩

為細散每服二錢煎敗扇湯調下食後服日二

勞風

論曰內經曰勞風發在肺下其為病也使人強上冥視
唾出若涕惡風振寒夫勞風之病腎勞則根勞於下經
所謂根弱則莖葉枯矣故目視不明而背反強腎之脉
入肺中故因皮毛感風而振慄也腎主唾故津液凝結
唾如涎涕治之以救其俛仰者戒其勞動也

麻黃湯方 治勞風胸膈不利涕唾稠黏上焦壅滯喉
中不快

麻黃

去根節

荊芥穗

杏仁

去皮尖雙仁

木香

當歸

黃芩

去黑心

羌活

芍藥

訖胡

大黃

炮熟各一分

半

夏

湯洗七遍去滑一錢

牽牛子

半兩

每服二錢生薑一片同煎食後溫服

芎藭圓方

治勞風強上冥視

芎藭

一兩

枳殼

去瓤麩炒

為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸食後溫水下

姜蕤飲方

治勞風項強急痛四肢煩熱

萎蕤

三人

人參

羚羊角

二兩 各

每半兩入豆豉三合葱白一握以水煎分溫空腹二

服

風頭旋

論曰風頭旋者以氣虛怯所稟不充陽氣不能上至於腦風邪易入與氣相鼓致頭運而旋也又有膈胸之上痰水結聚復犯大寒陰氣逆上風痰相結上衝於頭亦令頭旋

松香散方

治風頭旋

松實

去殼

白芷

當歸

芎藭

甘草

炙各三兩

甜瓜子

洗一升

同搗羅為細散每服二錢食後以荊芥薄荷清茶調

下

荊芥丸方 治風頭旋目痛眩肢體拘急手足少力

荊芥穗

四兩

細辛

芎藭

白殭蠶

炒各一兩

天麻

一兩半

羌活

防風

蒺藜子

炒去角各一兩

同為末煉蜜丸如鷄頭大每服一九食後細嚼荊芥湯下茶酒亦得

人參丸方 治風頭眩目眩痰逆惡心胸膈痞滯欬嗽痰涎喘滿嘔逆不欲飲食

人參 甘草 白朮 旋復花炒各一兩 麥門冬 前

胡 枳殼各二兩 木香半兩

同搗羅為細末以湯浸炊餅和丸如梧桐子大每服二十九食後生薑湯下

祛痰九方 治風頭旋痰逆惡心咽膈不利

天南星

生

半夏

生

赤茯苓

乾薑

炮

陳橘皮

湯浸
去白

焙各

等分

稀麴糊丸如梧桐子大每服三十九丸加至四十九丸溫

米飲下

羚羊角湯方 治熱毒風上攻頭面目旋運耳內虛鳴

身體癰疹麻痺

羚羊角

二兩

菊花

三兩

防風

去

羌活

前胡

藁本

玄參 黃芩

杏仁

去皮尖
雙仁

菖蒲

甘草

炙各
一兩

每服五錢水煎食後溫服

治頭旋腦悶鼻塞眼運貼膏頂方

蓖麻子

去殼
研

杏仁

去皮
研

食鹽

芎藭

搗
末

松脂

研各
等分

先搗食鹽次下四味杵勻即塗於蠟紙上有病者先
灸百會三壯訖將蠟紙藥於灸處貼之日一易得膿
血出效

風痰

論曰風痰之病得於氣脉閉塞水飲積聚其狀雖有冷熱之異至於心胸痞隔飲食不化則一也蓋風壅氣滯三焦不和則水飲易至停積風能生熱壅亦成痰是故有頭目不利神思昏濁之候其或嘔逆不納飲食者則因於胃冷而得之其治固不可一槩也

半夏飲方 治風痰心腹煩滿嘔逆不欲飲食

半夏湯浸去骨 大腹皮 麥冬 赤茯苓 白朮 桔

梗 前胡各三分 青橘皮去白厚朴 防風 枳

杷葉

拭去毛炙
各半兩

每服三錢入生薑一棗大同煎稍熱服

澤瀉湯方 治風痰壅滯胸膈不利頭目昏眩不思飲食

澤瀉 前胡 白朮 赤茯苓 甘草 人參

半夏

湯洗七度切作片以生薑汁浸焙乾炒各一兩

檳榔

陳橘皮

湯浸去白

焙各三分 枳殼 去瓤麩炒半兩

每服二錢半生薑半分同煎溫服不拘時候

鐵刷湯方

治風痰胃中有寒嘔吐痰涎胸滿氣逆

附子

五枚炮令微折地上以
盆子覆冷取去皮臍

半夏

湯洗七遍去
滑麩炒一兩木

香

半兩

剉如麻豆每服二錢入生薑一棗大大棗三枚同煎
空心食前溫服

天南星丸方

治風痰胸膈煩滿頭目昏眩

天南星

一觔每枚
重一兩者

用湯浸洗刮去浮皮并虛軟處令淨用法酒浸一宿

以桑柴蒸不住添熱湯令釜滿甑內氣旺更不住灑
酒常令藥潤七箇時滿取出用銅刀切開揀大者微
嚼看不麻人口即是熟未熟即便蒸候熟用銅刀子
細切入石杓內木杵爛擣如泥入丹砂一兩水飛過
者麝香一兩細研羅過丁香末一兩龍腦一兩同擣
令勻丸如鷄頭大又用丹砂末一兩為衣每服一九
嚼破用薄荷茶或酒任下小兒驚風半丸合時忌鷄
犬婦人見

前胡丸方 治風痰不散食逆嘔吐

前胡

白朮

枳殼

去瓤炒

半夏

湯洗七遍去滑

赤茯苓

人參

各三分

白礬

半兩枯

丁香

一分

為末棗肉和丸如梧桐子大每服二十九煎生薑竹茹湯下食後服

遂痰丸方 治風痰壅盛每日早時多喜嘔吐

人參

赤茯苓

乾薑

半夏

湯洗七遍去滑各一兩

為末以粟米飯和丸如梧桐子大每服二十九空心

生薑湯下日午再服

胃風

論曰胃風之狀頸多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿失衣則臌脹食寒則泄注形瘦而腹大蓋胃者水穀之海五臟六腑之大源因而食寒失衣則風邪入易感故證頸多汗惡風者以人迎胃脉之所動也食飲不下膈塞不通腹善滿者其經循腹裏其病在中焦也失衣則臌脹者重感於風邪傷肌肉也食寒則泄者風寒交

傷於胃故泄注也形瘦者精不營也腹大者氣不通也
豆蔻丸方 治胃風頸項多汗惡風飲食不下膈塞不
通腹善滿失衣則腹脹食寒則泄形瘦而腹大

肉豆蔻

去殼半兩

羌活

防風

桔梗

炒各一分

陳橘皮

湯浸

白獨活

去蘆頭

薏以仁

人參

草豆蔻

去皮芎藭

各半

兩

甘草

木香

各等分

為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九至四十九
米飲下日三夜一

厚朴煮散方 治胃風冷氣攻心腹脹滿疼痛飲食不

消四肢羸瘦

厚朴

薑汁炙

訶梨勒

煨去核各一兩

木香

蒼朮

米泔浸一宿切焙

枳殼

當歸

桔梗

炒各一兩

陳橘皮

湯浸去白二兩

為散每服三錢棗一枚同煎溫服

風秘

論曰風秘之病以大腸秘澀不通大腸者肺之腑通行水穀傳導所出若三焦不和風熱所搏則腸胃乾燥津

液虛少糟粕結聚傳導不行令人心煩腹滿便秘不通也

前胡丸方 治風氣潤利腸胃

前胡_{二兩} 大黃 黃芩 木通 麻子仁 芍藥_{各一兩}

分兩一

共為末鍊蜜為丸如豌豆大每服十五丸溫水食前下

調中丸方 治大腸風熱秘澀不通

大黃

鼈甲

醋炙黃
去裙襖

朴硝

桃仁

湯浸去皮尖雙
仁麩炒各四兩

皂莢

五挺去皮椎碎用水
一升投取汁濾過

萊菔

一觔椎碎
絞取汁

共六味將前四味為末以陳醋一升半同萊菔皂莢

煎五七沸後入藥末同熬得所九如梧桐子大每服

二十丸米飲下

木香丸方

治腸胃風熱津液燥少大便秘澀

木香

半兩
兩 檳榔

大黃

煨

麻子仁

各二兩

牽牛子

末
郁

李仁

湯浸
去皮

枳殼

去瓢麩炒
各一兩

金匱要略卷之二
為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫米飲下食
前

威靈仙散方 治老人風氣壅盛大腸秘澀五六日方
大便一次頭旋目暗發作無時

威靈仙一兩酒浸培乾羌活去蘆頭芍藥各半兩

為散每服二錢空心蔥湯調下

香枳散方 治大腸秘祛風順氣

枳殼去瓢麩炒防風各一兩甘草炙半兩

三味搗羅為散每服二錢沸湯點服

引飲導秘丸方 治風熱大腸秘澀不通心煩腹滿體熱

檳榔

木香

芎藭

羌活

桂

各二兩

大黃

濕紙裹煨

郁李仁

浸去皮尖各四兩

為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九漿水下茶湯亦可

瘰癧風

論曰瘰癧風之病其狀斑駁點點相連而大圓橢似自駁

而稍微也皆由風邪熱氣搏於脾肺二經流散肌肉使然也

烏蛇散方 治瘰癧風頸面斑駁

烏蛇

酒浸去皮
骨炙二兩

秦艽

芎藭

各一兩半

桂

羌活

人

參

山梔子

枳殼

丹參

沙參

玄參

犀

角

鎔各一兩

升麻

防風

木通

白鮮皮

黃芩

蒺藜子

炒去角一兩

苦參

二兩

共為散每日溫酒調下三錢食後臨臥服

雄黃散塗方

治瘰癧風面頰頸忽生斑駁其狀如癬

雄黃

硫黃

白礬

並研如粉
各一分

三味合研勻以鍊成猪脂調和塗上

附子散塗方

治瘰癧風身體斑駁

附子

一枚大者
去皮生用

硫黃

研半兩

蒼耳苗

一握
乾者

三味搗羅為末以米醋調先以布巾揩瘍上即以藥

塗之乾再塗

巴豆塗方

治瘰癧風面頰頸項忽生斑駁如癬

巴豆

去皮生用一分 醎醋合一

先以新布揩令赤如故沙盆內用醋磨巴豆如稀膏塗於患上

白駮

論曰白駮之病其狀駮斑如癬過如瘰癧但不成瘡爾皆由風熱搏於膚腠脾肺二經不和也

治白駮傳方

雄黃

石硫黃

各一兩
研如粉 蛇蛻皮一條大者燒灰

同研細用醋調成膏先以巴豆一粒中截以平處磨
令皮起然後傳藥三兩徧即瘥

治頭項及面上白駮漸長如癬但不成瘡宜用此傳方

桂 去粗皮
一兩

研為末每用半錢或一錢以津唾和傳於白駮上日

三

治面項身體白駮傳方

鮎魚

一頭約重半斤去腸肚淨洗後一依鮮法用
鹽葱粳米飯勻拌即用青荷葉裹作三包

各用蒲
片擊

更用荷葉裏裏令大臭爛先以布拭白駮令赤次炙
鮓包熱熨令汗出以綿衣包無令風冷所傷

蛇蛻皮方 治周身白駮漸長似癬但不成瘡

蛇蛻皮

一條
大者

炒熱按摩白駮時時嚙唾數百徧弃之田野草中

鰻鱺魚塗方 治頸項及面上白駮浸淫漸長如癬狀

但不成瘡

鰻魚

一條肥者

炙令脂出先將白駁用物揩拭之令小痛然後用魚脂塗

大蛇皮塗方 治面項身體白駁風

蛇蛻皮

大者燒作灰

石硫黃

研

槲皮

燒作灰錢

三味令研極細以清熟漆調和勿令稠鞭薄塗白駁處欲塗藥時先以巴豆中截用平處摩令皮微起然

後傳藥

白癰風

論曰白癰風之狀皮膚皴起生白斑點是也由肺臟壅熱風邪乘之風熱相并傳流榮衛壅滯肌肉久不消散故成此疾也

烏蛇散方 治白癰風身體痛麻

烏蛇酒浸去皮骨炙三兩 白殭蠶炒 胡麻子 獨活 天麻

各二兩 烏頭去皮臍 細辛 防風去人 桂 枳實 蟬蛻

白附子炮各半兩 天南星一分

為散每服溫酒調二錢不計時候

治白癰風方

杏仁

去雙仁不去
皮尖生用

每日早晨爛嚼二七粒於白點處揩夜臥再用

治白癰風方

鷄子

二枚和殼以米醋
三升浸七日取白

石硫黃

研半兩

附子

去皮臍
生用一

枚重半

粟米

二錢

兩者

共四味將後三味搗羅為末以前鷄子白調如稀糊

臨用藥先以葛布指患處令赤塗之

苦參膏方 治白癩風

苦參

鹽

各一分

研為末先以酒一升煎至四合入藥二味攪勻慢火再煎成膏每用先以生布指患處令赤塗之

紫癩風

論曰紫癩風之狀皮膚生紫點搔之皮起而不痒痛是也此由風邪挾溼客在腠理榮衛壅滯不得宣流蘊瘀

皮膚致令色紫故名紫癰風

烏蛇散方 治癰麻紫癰風

烏蛇酒浸去皮骨炙 防風 羌活 人參 玄參 沙參

苦參 丹參 白附子 蒺藜子炒去角各一兩

為散每服一錢溫酒調下

附子硫黃散方 治紫癰風斑點

附子生用去皮臍一枚 石硫黃別研半兩

共研為細散入胡粉一分膩粉少許同繁柳汁和勻

臨臥指三五徧早晨溫漿水洗不三五夜瘡

牡蠣散方 治紫癰風

牡蠣

膽礬

各半兩

二味生用為散釅醋調摩患處

胡桃塗方 治紫癰風并白癰風

初結青胡桃

一類取外皮用

石硫黃

一皂子研如粉

二味先取胡桃皮切研如膏入硫黃末和勻塗之

羊蹄根塗方 治紫癰風

羊蹄根

紋自然
汁半合

生薑

紋自然
汁半合

石硫黃

四錢研
如粉

三味將二汁與硫黃末同研令粘塗患處一日不得洗不過兩上差

惡風

論曰惡風者皆五風厲氣所致也風有青白赤黑黃之異其毒中人五臟則生蟲亦有五種蟲生息滋蔓入於骨髓五臟內傷形貌外應故食肝則眉睫墮落食肺則鼻柱倒塌食脾則語聲變散食腎則耳鳴如雷鼓之聲

心不受食食心則為不可治是故謂之惡風

五參散方 治惡風

人參 沙參 丹參 玄參 苦參 木通 蒺

藜子

烏蛇

浸去皮
骨炙

乾蝎

天麻

赤箭

何首

烏

陳橘皮

各一兩

黃芩

半兩

原蠶蛾

一分

並生用為散每服三錢熱茶調下服及半料即減服
二錢初服三日後先覺頭項脊膂身上疼痛乃藥力
與病相擊也當安臥兩復時許即無事如或身上有

瘡腫服藥一日後便覺漸減

何首烏九方 治脾肺風并惡風等疾

何首烏 石菖蒲 荊芥穗 蒼耳 胡麻

炒各兩

玄參 沙參 苦參 白花蛇

酒浸去皮骨

烏蛇

酒浸去皮

骨各半兩

共搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九茶酒任下如要作散每服二錢溫酒調下不計時候

威靈仙散方 治惡風

威靈仙二兩 丹參六兩 羌活一兩 獨活一兩 蒼耳四兩 仙靈脾

玄參 人參 沙參各二兩 紫參一兩 甘草一兩 黃芩

各二兩

為散食後臨臥溫水調下一錢若身體無瘡眼腫人不
斷鼻梁不塌服之一料可差

蔓荊實方 治肺臟風毒發作如癩變成惡風證

蔓荊實去白皮生用四兩 胡麻研為末炒熟半兩 天麻二兩 菊花未開

者良生用四兩 天南星 枸杞生用四兩 苦參研取粉四兩

為散每服溫酒調下二錢日三夜一每服宜去食稍遠恐藥食相犯

大風眉鬚墮落

論曰大風眉鬚墮落者蓋癩病也皆由惡風染著榮衛不清風溼毒氣浸漬肌肉致淫邪散溢痒癢成瘡皮膚瘍潰鼻柱倒塌鬚眉墮落

枳殼散方 治大風癩病眉鬚墮落熱毒風入五臟身體頭面生瘡

枳殼

去瓢
麩炒

黃耆

蒼耳

白朮

蒴藋

白蒺藜

炒

防風

生用

升麻

生用

梔子仁

研三分

漏蘆

黃連

人

參

天門冬

防己

乾薑

芫薺

丹參

麻

黃

去根節
煮去沫

白芷

甘草

炙

葛根

各半兩

玄參

堅者
三兩

烏

蛇

酒浸去皮
骨炙一兩

共為末散每服溫酒調下二錢至三錢空心夜臥服

梔子散風

治大風癩疾肩鬚墮落偏身痺麻手攣縮

山梔子

二兩半

芫薺

一兩半

藁本

三分

當歸

蔓荊實

各一

兩桔梗

一分兩

羌活

白蒺藜

白茯苓

防風

各一

兩三

側子

天麻

各半兩

每日空心溫酒調下二錢加至三錢夜臥時再服服

至一料眉鬚再生

羚羊角飲方

治大風癩身上生瘡并面部浮腫眉鬚

墮落四肢癱痺

羚羊角

銹

甘草

各三分

獨活

山梔子仁

各一兩半

防風

一兩枳殼

黃耆

蒺藜子

丹參

去苗少炒

玄參

木

通

各一分

每服五錢水煎溫服每日早食後及夜臥各一服

大風出蟲

論曰蟲動物也皆風之所化風入五臟化生五蟲則成五癩入肝其蟲青入心其蟲赤入脾其蟲黃入肺其蟲白入腎其蟲黑四蟲皆可治惟黑蟲為難療或所傷未深專意治之亦差者

熟艾方 治大風癩熏出蟲

艾葉

別採全熟

砒霜

研

水銀

與雄黃同研

膩粉

硫黃

丹

砂

研

阿魏

酒化去沙石麩和作餅炙

附子

雄黃

研細入水銀點醋再研全

星子盡始入膩粉砒霜

兩

硫黃丹沙同研各一兩

麝香

研半兩

豬牙皂角

一斤

去皮

末

共十一味除艾葉皂角別搗為末外並合細研用紙

四張先布次艾糝皂莢末次糝諸藥末卷刀切如餅

餡著椀內燒以小朱甌子籠椀以衣襯四邊坐於上

熏以衣被遮壅定不令透出氣熱悶即俯伏

四十二

獨活散方 治大風癰出五蟲

獨活

三分

雄黃

研半兩

青黛

研一分

麻黃

去根節煮沫半兩

水銀

一分與丹砂雄黃點醋同研以水銀星子盡為度

阿魏生研 雷丸

丹砂

滑石

研各半兩

石膽

牛黃

紫石英

研各一分

斑苗

十四

枚與糯米同炒去翅足米不用

芫青

四十枚與糯米同炒去翅足米不用

共一十四味研為散每服一錢空心溫酒調下不得

飽食晚更服當有蟲從小便中出或當日或三四日

至十日方出若瀉出赤蟲如爛櫻桃或如豆麥或瀉

出黃蟲似黃涕青蟲似青涕菜汁白蟲似馬尾蟲遇藥氣即死或隨大便下唯黑蟲如豆豉汁此為難治

大風癩病

論曰癩者內經為癘癘者榮氣熱其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰其證不同其始則乍寒乍熱腠理壅塞血氣精髓耗竭久而不治令人癢痺汗不流泄手足痠疼面目習習奕奕胸頸間狀如蟲行身體徧痒搔之成瘡或身體錐刺不痛青赤黃黑如腐木形或痛無常

處流移非一或似繩縛拘急不可俛仰眼目浮腫小便黃赤餘瀝心神恍惚而善噫也日月浸久其風化生毒蟲蟲既變動外先食氣血膚革不澤其內則食五臟食肝則眉睫墮落食肺則鼻柱損壞食脾則語聲散亂食腎則耳聞雷鼓之音食心則死推癰病率皆風與蟲之為害也

羚羊角散方 治大風癰疾

羚羊角

鎔

吳茱萸

湯洗焙炒各一分

羌活

獨活

各半兩

麻

黃

去根
節炙

烏蛇

酒浸去
皮骨

蔓荊實

去白
皮

當歸

黃耆

防風

附子

杏仁

去皮
尖

蒺藜子

炒去角
各半兩

犀角

鎊
一分

為散每服一錢空心服食前溫酒調下

烏蛇丸方 治大風癩疾若眼脉斷指節冷落脚下有

瘡語聲啞為不可治如未有此證宜服

烏蛇

一條酒浸去皮
骨首尾三兩

檀香

丁香

茜根

紫葛

防風

苦參

獨活

沙參

梔子仁

酸棗

仁用槐子

白芷

附子

藁本

防己

羚羊

角 蒼朮

醋炒

犀角

鎔

草薢

秦朮

桃膠

生用

蕪荑

仁

炒

括樓根

烏藥

各三

分

桑根白皮

剉三

兩

木通

一

兩

半

共搗羅為末，鍊蜜丸如赤小豆大，每服空心溫酒下十丸至十五丸，日二如不飲酒，薄荷槐白皮湯下如要速差宜用後湯藥下。

桑枝湯方

治大風癰疾下藥

桑枝

柳枝

槐枝

枸杞根

黃荊根

羚羊

角

一兩 各

六味並生用剉如麻豆大每服用藥五錢以水一盞
半煎七分下前九藥服一月必覺四體皮膚痒痛不
可忍但宜飲酒不得搔抓仍頻飲食避外風如有汗
必腥臭及有蟲從皮膚中出如麩塵或馬尾頭髮尖
或如線絲尖或如髮皮片頭黑身白形色不定但痒
之後仔細看之或從小便中出或從瀉泄中出者大
效此疾稍退終身禁房室又忌動風物時以苦參湯

洗浴須換新衣其舊衣并牀薦等並焚之

艾蒿醞酒方 治大風癰病身體面目俱有瘡痍惡汗

自出

白艾蒿

十束每束如升許
大淨擇水洗細剉

一味煮取濃汁拌麴米一如常醞法酒熟去糟取清
稍溫飲之令常醺醺然

天門冬丸方 治大風癰病

天門冬

去心生用五
斗研絞取汁

一味內瓷器中密蓋口以臘封勿失藥氣於淨室中
經一年取開其色赤如沙塘即入苦沙參粉及乾地
黃末為丸如梧桐子大每服十九溫水下食後服

百花煎方 治大風癩疾

白蜜

二十兩

石榴

七顆甜者并皮用

生薑

去皮細切八兩

三味先研生薑石榴絞取自然汁更濾令淨入蜜盛
於瓷瓶以蠟紙封口勿令通氣垂繫於釜中勿到底
以重湯煎一復時成煎空心酒調二錢加至三錢日

二夜一旬日內有惡物隨便而出是病根散矣

黃精丸煎方

治大風癩疾面赤疹起手足攣急身發

瘡痍指節落

黃精

生者十斤

白蜜

五斤

生地黃

肥者五斤

三味先將黃精生地黃洗淨細剉以木石杵臼搗熟復研爛入水三斗絞取汁置銀銅器中和蜜攪勻煎之成稠煎為度每用溫酒調化二錢至三錢日三夜一久服風癩瘡平面如童子延年不老

婁金丸方 治大風癩病

金箔

五十斤

牛黃

研

麝香

研

龍腦

研

白附子

炮

天竺

黃

各半兩

人參

白芷

細辛

芎藭

天南星

生用

各三分

天麻

白花蛇

酒浸肉炙

防風

各一兩半

黃芪

藻木

白僵蠶

羌活

麻黃

白茯苓

犀角

鎊

羚羊

角

芍藥

甘草

炙各一兩

甘菊

三兩

共研為細末別用生地黃汁二升蜜半觔酒一觔酥三分慢火同煎成放冷和藥末勻丸如鷄頭大每服

三九細嚼茶酒任下

黃芪九方 治大風癰疾

黃芪 防風 丹參 白朮 白茯苓 芎藭

山梔子 赤芍藥 枳殼 細辛 各一兩半 大復皮 一兩

三分 升麻 秦艽 各二兩 蒺藜子 獨活 苦參 各三兩

共為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹煎枳殼湯下二
十九日再服

烏癰

論曰烏癩初覺皮膚變異肌腠之間淫淫躍躍如蟲行
動眼前有物如系懸布時發驚恐言語錯亂皮肉癢疹
如桃李實或赤或黑手足痛痺不知痛所或脚下痛不
可踐地身體生瘡兩肘如縛此名黑癩皆由惡風日漸
傷損血氣不榮所致也

馬先蒿散方 治烏癩

馬先蒿

不計多少一名馬禾蒿
名爛石草細切焙乾用

搗羅為散每服一錢荊芥薄荷湯下

治烏癩浸酒方

苦參根白皮

五斤

細剉如麻豆生絹袋貯好酒三斗冬浸七日夏浸四

日每溫飲二合至三合

日二夜一漸加五七合

露蜂房酒方 治烏癩

露蜂房

五兩

苦參

四斤

二味剉細用水三斗煮取一斗五升去滓浸麴四觔

半炊黍米二斗如常醞法酒熟每服三合至五合日

二夜一稍增無妨

雌黃散塗方 治烏癩

雌黃

半兩

以米醋和鷄子清如膏塗瘡上乾即便塗

白癩

論曰白癩之狀語聲嘶啞目視不明四肢癢痺關節熱痛如火燔灼脊脊拘急肉如刀劈手足緩弱身體癢疹鼻生息肉生白珠肉色斑白故謂之白癩也

烏蛇散方 治白癩語聲嘶敗四肢癰痺瘙痒生瘡

烏蛇

酒浸去皮骨炙

葛根

各一分

苦參

紫參

沙參

人參

芎藭

天麻

黃苓

木通

地骨皮

防風

防己

白朮

蒺藜

黃連

莽草葉

木蘭皮

附子

炮去皮臍

烏頭

炮去皮臍

牛膝

萎蕤

櫟

榔

煨熟乾

地黃

芍藥

桂

玄參

龍骨

研

石膏

研

升麻

菊花

未開者妙

蒺藜子

炒去角

秦朮

細

辛

去苗

天雄

炮去皮臍各一兩

當歸

切焙

甘草

炙

遠志

巴

戟天

蒼耳花

炒乾各三分

吳茱萸

湯洗

麝香

研各半兩

右四十二味擣研細羅為散每服二錢空心溫酒調

下加至三錢晡時服

白花蛇散方

治白癩語聲嘶喎目視不明四肢癢痺

關節熱痛身體癢疹鼻生息肉

白花蛇

酒浸去皮骨

天麻

槐子

羌活

防風

晚

蠶沙

炒

蔓荊實

白鮮皮

威靈仙

枳殼

各一兩

甘草

炙半兩

擣羅為散每服一錢溫酒調下不拘時候

諸痺統論

論曰飲天和食地德皆陰陽也然陽為氣陰為血氣為衛血為榮氣衛血榮通貫一身週而復會如環無端豈鬱閉而不流哉夫惟動靜居處失其常邪氣乘間曾不知覺此風寒溼三氣所以雜至合而為痺淺則客於肌膚深則留於骨髓陽多者行流散徙而靡常陰多者凝泣滯礙而有著雖異狀殊態然即三氣以客之則所謂

痺者可得而察矣且痺害於身其為疾也初若無足治至其蔓而難圖則偏廢弗舉四體不隨皆自詒伊戚者也可不慎哉

痛痺

論曰寒氣勝者為痛痺夫宜通而塞則為痛痺之有痛以寒氣入經而稽遲泣而不行也痛本於寒氣偏勝則陽氣少陰氣多與病相益治宜通引榮衛溫潤經絡血氣得溫則宣流自無壅閼矣

茯苓湯方 治風溼痺四肢痛痺拘攣浮腫

赤茯苓 桑根白皮 各二兩 防己 桂 芍藥 芍

藥 麻黃 去根節各一兩半 甘草 炙一兩

每服五錢棗一枚去核水煎溫服連三服後以薑粥

投之汗出為度

天雄丸方 治風溼痺皮肉不仁骨隨疼痛病不可忍者

天雄 去皮臍 附子 去皮臍炙 桂 半 乾薑 炮三兩 防風

三錢

為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒下日

三夜一

當歸摩膏方 治諸風寒濕骨肉痺痛

當歸

細辛

半一兩

桂

一兩

生地

黃

一斤切研

絞取汁

天雄

十枚

去皮臍
生用

芎藭

半兩

白芷

三分

丹砂

研一兩

乾薑

三分

烏頭

生用

一兩
三分

松脂

四兩

豬脂

四兩別

鍊去滓

共十二味先將八味剉如大豆粒以生地汁浸一宿

與豬脂松脂同慢火煎候煎白芷黃色以厚綿濾去

淬瓷盒盛入丹砂末不住攪至凝即止每用藥用火炙手摩病處千徧

著痺

論曰內經謂溼氣勝者為著痺地之溼氣感則害人皮肉筋脉蓋溼土也土性重緩榮衛之與溼俱留并以溼勝則著而不移也其證多汗而濡者以陰氣勝也治宜除寒溼通行經絡即差

天雄酒方 治寒溼著痺皮肉不仁至骨髓疼痛

天雄

附子

去皮
臍

防風

獨活

當歸

白朮

五加皮

芎藭

桂

乾薑

二兩

剉如麻豆以夾絹囊盛用無灰清酒一斗浸春夏五

日秋冬七日溫飲仕性加減以醉為度

茯苓湯方 治風溼痺自著不去四肢癱麻拘攣浮腫

赤茯苓

桑根白皮

各二兩

防己

桂

芎藭

各一兩半

甘草

三兩

芍藥

當歸

麻黃

去根節煮
各一兩半

每服六錢棗三枚劈破同水煎溫服如欲出汗以生

薑熱粥投之汗出慎外風

治風溼著痺服藥雖多肌肉猶痛痺摩風膏摩之方

防風 羌活 芎藭 細辛 蜀椒

去目并開口 當歸

白斂 躑躅花

各半兩

白朮 丹參 黑參 桂

附子 烏頭 皂莢 莽草

各一分

杏仁 苦參

半兩一兩

細剉如麻豆以米二升拌勻浸三宿熬乾同臘月豬

脂二觔以文武火煎一日綿濾去滓瓷餅貯每用少

許點摩痛痺處煎治一切風毒具膏年歲深久者

尤佳

龍虎膏方 治風溼著痺肌肉癢厚不知痛痒

龍骨

二兩

虎骨

三兩酥塗炙

當歸

桂

各一兩

皂莢

半斤肥者去子

共為末先別用好肥皂莢十挺以苦酒三升按取汁去滓入鐺中煎減半即入前藥同煎如稀餚入瓷盒盛每用少許揩摩癢痺處

行痺

論曰內經謂風寒溼三氣雜至合而為痺其風氣勝者為行痺夫氣之在人本自流通所以痺者風寒溼三氣

合而為病然三氣之中各有陰陽風為氣善行數變故風氣勝則為行痺其證上下左右無所留止隨其所至氣血不通是也治法雖通行血氣宜多以治風之劑

防風湯方 治行痺行走無定

防風

甘草

各一兩

黃芩

三分

當歸

赤茯苓

各一兩

秦

朮

葛根

三分桂皮去粗

杏仁

炒各一兩

麻黃

去根節煎去沫半兩

每服五錢棗二枚生薑五片酒一鐘水一鐘同煎溫

服

山茱萸九方 治風痺遊走無常處亦治血痺

山茱萸

炒一分一兩

生乾地黃

二兩

山藥

牛膝

澤瀉

草薢

各一分

天雄

鱗蚱

車前子

乾漆

狗脊

去毛白朮

地膚子

各三分

茵芋

半兩

共為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服溫酒下二十九
加至三十丸

皮痺

論曰風寒溼三氣雜至合而為痺以秋遇此者為皮痺

蓋肺主皮毛於五行為金於四時為秋當秋之時感於三氣遂為皮痺蓋正言其時之所感者爾固有非秋時而得之者皮膚不營而為不仁則其證然也

防風湯方 治肺中風寒溼項強頭昏胸滿短氣嘔吸顫掉言語聲嘶四肢緩弱皮膚痛痺

防風

芍藥

麻黃

各一兩

獨活

桂

前胡

五

味子

附子

杏仁

人參

茯苓

各三分

甘菊花

黃芪

甘草

各半兩

每服四錢生薑五片水煎溫服

蔓荊實丸方 治皮痺不仁

蔓荊實

去浮皮
三錢

防風

羌活

桔梗

白附子

枳殼

蒺藜子

炒去角
各半兩

皂莢

半斤新水浸一宿絹
濾去滓入麴少許同

煎成
膏

七味為末入膏中和搗丸梧桐子大每服二十九食
後熱水下

天麻丸方 治皮膚癢痺

天麻

二兩

玄參

沒藥

研

地榆

烏頭

各一兩

麝香

研一

分

四味為末與二味研者和勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九空心食前溫酒下

肌痺

論曰風寒溼三氣雜至合而為痺以至陰遇此者則為肌痺其狀皮膚弗營肌肉痛痺而不仁是也

西州續命湯方

治肌痺津液閉泄時復不仁或四肢

急痛

麻黃

去根節煎
去沫焙乾

當歸

切焙

石膏

研各二兩

芎藭

桂

甘

草

黃芩

防風

芍藥

各二兩

杏仁

湯浸去皮尖炒四十枚

每服四錢生薑一片棗二枚水煎溫服不計時候

細辛湯方 治肌痺淫淫如蟲行或膝理開疎汗出皮

膚肉色不澤脣鼻黃

細辛

防風

白朮

附子

桂

各一兩

石膏

研

黃

芪

麻黃

去根節煎掠去沫焙乾各二兩

枳實

去白麩炒

甘草

各半兩

當

歸一
兩

每服四錢生薑五片水煎溫服

血痺

論曰血痺之狀形體肌膚如被微風所吹者是也蓋血為陰邪入於血而痺故謂之血痺宜先鍼引陽氣後以藥之

芍藥湯方 治風血痺身體不仁肉冷

赤芍 側子 桂 麻黃 草薢 當歸 丹參

各一兩
細辛
甘草
各半兩

每服三錢生薑五片水煎溫服

黃芪湯方 治風血痺陰陽俱微寸口關上微或尺中

小緊其狀身體不仁如賊風所中

黃芪 芍藥
各一兩
桂
三分

每服五錢棗二枚生薑三片水煎早晨日午晚每各

一服

單辭九方 治風邪遊走無定處名曰血痺

草薢 山藥 牛膝 澤瀉 各一兩 白朮 三分 地膚子

半兩 山萸 炒一兩 狗脊 三分 茵芋 一分 熟乾地黃 三分

共為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九丸溫酒下不

拘時稍加至五十丸

脉痺

論曰血性得溫則宣流得寒則凝澀凝澀不行則皮毛
萎悴肌肉痛痺內經謂風寒溼三氣雜至合而為痺又
曰夏遇此者為脉痺痺則血凝不流可知也

人參丸方 治脉痺通行血脉

人參 麥門冬 茯苓 龍齒 遠志 黃芪

菖蒲

赤石脂

各一兩

熟乾地黄

二兩

為末鍊蜜丸如梧桐子大每服食後良久以清粥飲
下三十丸

防風湯方 治脉痺

防風 當歸 秦艽 赤茯苓 茵芋 甘草

去莖炙

桂

去粗皮

杏仁

去皮尖雙仁麩炒

獨活

各一兩

每服五錢以酒水各半生薑半分同煎服

筋痺

論曰經曰風寒溼三氣雜至合而為痺又曰以春遇此者為筋痺其狀拘急屈而不伸是也筋痺不已復感於邪內舍於肝是為肝痺其狀夜臥則驚飲多數小便上為引如懷蓋淫氣之竭痺聚在肝治法以筋痺為先筋痺既平則邪弗入於肝矣

天麻丸方 治筋風四肢攣痺

天麻 細辛 菖蒲 赤箭 地榆 人參 各二兩

附子 芍藥 木香 各一兩 桂 半兩 苦參 三兩 牛膝 酒浸

二兩 陳橘皮 湯浸去白 當歸 切焙 赤芍 酸棗仁 威

靈仙 去土 藁本 防風 獨活 各二兩

共為細末，鍊蜜和杵為丸。如梧桐子大，每服溫酒下二十九至三十丸。

牛膝湯方 治筋痺以筋虛為風所傷，故筋攣縮腰背不伸，強直時痛。

牛膝

酒浸

防風

丹參

前胡

各二兩

石斛

二兩

桂

塗酥

炙秦朮

去苗上

續斷

各一兩半

陳橘皮

去白一兩

大麻仁

合一

除大麻仁外擣篩每服五錢煎熟別下麻仁末一錢

再煎空心服日二

防風湯方

治肝痺頭目昏塞四肢不利胸腹虛煩

防風

一兩

芎藭

黃芪

五味子

人參

茯神

獨活

羚羊角

銹屑

前胡

各三分

細辛

酸棗仁

甘

草

各半兩

每服三錢大棗三枚水煎溫服

骨痺

論曰經謂人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨腎不榮則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄肝一陽也心二陽也腎孤藏也一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨痺是人當攣節也夫骨者腎之餘髓者精之所克也腎

水流行則髓滿而骨強迨夫天癸虧凝澀則腎脂不長
腎脂不長則髓涸而氣不行骨乃痺而其證內寒也雖
寒不為凍慄則以肝心二氣為陽火一水不能勝之特
為骨寒而已外證當攣節則以髓少而筋燥故攣縮而
急也

石斛丸方 治腎虛骨痺肌體羸瘦腰脚痠疼飲食無
味小便滑數

石斛

去根

牛膝

酒浸

續斷

各三分

兔絲子

酒浸

石龍芮

炒研

桂各一兩

肉蓯蓉

酒浸三分

鹿茸

去毛酥炙一兩

杜仲

白茯苓

熟乾地黄

各三分

附子

一兩

巴戟天

半兩

防風

三分

桑螵蛸炙

芎藭

各半兩

山茱萸

三分

覆盆子

半兩

補骨脂

華澄茄

各三分

五味子

半兩

澤瀉

一兩

沉香

懷香子

各三分

薏苡炒

仁一兩

共為末鍊蜜和杵數百下丸如梧桐子大每服空心

以溫酒下三十九日二服

熟乾地黄丸方 治腎虛骨痺面色萎黑足冷耳鳴四

肢羸瘦脚膝緩弱小便滑數補腎

熟乾地黄

肉蓯蓉

酒浸

磁石

煅醋淬二兩

山茱萸

分三桂

去粗皮

附子

各半兩

山藥

分三

牛膝

酒浸切焙一兩

石南

白茯苓

苓

澤瀉

黃芪

各三分

鹿茸

去毛酥炙二兩

五味子

分三石

斛

一兩

覆盆子

分三

遠志

分三

補骨脂

炒一兩

萆薢

巴戟

天

各三分

杜仲

一兩

兔絲子

二兩酒浸別研

白龍骨

一兩

共為末鍊蜜和杵數百下丸如梧桐子大每服空心

以溫酒下三十九日三服

腸痺

論曰內經曰腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄夫大腸者傳導之官其所以傳導者皆沖和之氣今風寒溼三氣乘虛客於腸間則邪留而和氣閉矣故其證數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄大小腸氣痺水道不通故雖多飲而不得洩便并氣於大腸使糟粕不故中氣喘爭時發飧泄也

草豆蔻散方

治腸虛寒溼內攻腹痛飧泄

草豆蔻

陳橘皮

湯浸去白
各一兩

桂

木香

白朮

當歸

切焙

白豆蔻仁

丁香

肉豆蔻仁

良薑

各半

兩

為散每服一錢生薑棗湯調下食前服

訶梨勒丸方

治腸痺飧泄復脇脹滿

訶梨勒

煨用皮
一兩

乾薑

三分
當歸兩

炒一兩

黃連

去鬚
一兩

白朮

一兩
木香

三分
厚朴

生薑汁
炙一兩

為末鍊蜜和杵二三百下丸如梧桐子大每服三十

九粥飲下不拘時候

周痺

論曰黃帝鍼經謂周痺者在於血脉之中隨脉以上隨脉以下不能左右各當其所夫風溼寒之為痺本痺而
不通今乃能周身上下者以其邪中於血脉之間與脉
流通隨氣上下升降無礙也

黃芩湯方 治周痺身體不仁

黃芩

甘草

防風

各半兩

秦朮

葛根

杏仁

炒 欬

各一分 桂

當歸

赤茯苓

各半兩

為散每服六錢水酒各半棗二枚生薑一片同煎溫服日二夜一

續命湯方 治八風十二痺

羌活

三分 茯苓

薏以仁

炒各一兩

每服六錢別入竹瀝一匙更煎數沸溫服日二夜一

醍醐方 治寒溼周痺

醍醐

一兩

每日空心以溫酒五合和一匙服之

大豆藥方 治周痺除五臟留滯胸中結聚益氣止毒

皮毛補腎

大豆藥

一升炒令香熟

為末每空心溫酒調下一匙再加

野駝脂方 治周痺

野駝脂

鍊了濾過一斤

別入好酥四兩同鍊攪勻每服半匙以熱酒半盞和

化服之加至一匙空心食前各一服

痺氣

論曰內經謂人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何是人多痺氣也陽氣少陰氣多故寒如從水中出夫陽虛生外寒陰盛生內寒人身陰陽偏勝則自然生寒熱不必外傷於邪氣也痺氣內寒者以氣痺而血不能運陽虛而陰自勝也血凝泣而脉不通故其證身寒如從水中出也

溫補鹿茸丸方

治陽氣虛陰氣盛痺氣內寒如從水

中出

鹿茸

酥炙
四兩

人參

天雄

五加皮

五味子 牛

膝

酒浸

防風

遠志

石斛

山藥

狗脊

各一兩

肉

蓯蓉

酒浸
切焙

熟地黃

各三兩

萆薢

石南

蛇牀子

白朮

各三分

巴戟天

天門冬

杜仲

各一兩半

乾薑

吳茱萸

炒

桂

附子

去皮
臍

細辛

蜀椒

去目并合
者各三分

白茯苓

兔絲子

酒浸別搗
一兩一分

覆盆子

石龍芮

各二兩

除兔絲子別擣外擣羅為末再拌勻鍊蜜丸如梧桐子大每服溫酒下二十九加至三十九空心食前日

三

補益黃芪丸方 治陰盛陽虛痺氣身寒如水中出

黃芪

鹿茸

炙酥

白茯苓

烏頭

去皮臍

乾薑

各三分

桂

芍藥

當歸

熟乾地黄

各一兩

白朮

兔絲子

酒浸

一宿別搗

五味子

栢子仁

枸杞根

各一兩半

大棗

去核廿枚

共十五味除兔絲子別搗外同搗羅再拌勻鍊蜜丸
如梧桐子大每服空心溫酒下十五丸日三

熱痺

論曰內經於痺論有云其熱者陽氣多陰氣少陽遭陰
故為熱痺蓋腑臟壅熱復遇風寒溼之雜至客搏經絡
留而不行遭其陰故痛痺燭熱而悶也

升麻湯 治熱痺

升麻 射干 甘草 芎藭 人參 赤小豆

各二兩

炒三

合 麥門冬

生薑

萎蕤

各三兩

每服四錢生地黃汁半合青竹葉十五片水同煎溫

服不拘時候

犀角升麻湯 治熱痺

升麻

二兩

茯苓

人參

防風

犀角

鎔

羚羊角

羌活

去蘆頭
各二兩

桂半兩

每服四錢生薑一塊竹瀝少許水同煎溫服

聖濟總錄纂要卷二